



Профилактика клещевого вирусного энцефалита

В Российской Федерации наблюдается сезонная активность клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.

Заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики – клещи. Наиболее неблагоприятными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы.

В целях предотвращения присасывания клещей необходимо:

- соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории: одежда детей должна быть светлой и однотонной, обязательен головной убор, носки с плотной резинкой;
- во время нахождения в лесной зоне проводить профилактические взаимоосмотры каждые 15 минут;
- после возвращения из леса тщательно осматривать одежду и кожные покровы детей и сопровождающих их лиц;
- не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

Основными средствами специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита служат вакцинация или экстренная профилактика человеческим иммуноглобулином.

В календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и профилактических прививок по эпидпоказаниям», включена профилактическая прививка против клещевого вирусного энцефалита.

Обязательной вакцинации подлежат лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях; лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица.

Для формирования иммунитета у большинства привитых достаточно двух прививок с интервалом в 3-4 недели. При необходимости этот интервал может быть сокращен до 2х недель (экстренная схема). После первичного курса из двух прививок иммунитет сохранится в течении 1 года. Для выработки полноценного и длительного (не менее 3х лет) иммунитета необходимо сделать третью прививку через 9 – 12 месяцев.

Обращаем внимание, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда на неблагополучную территорию.