

Нефроптоз

Это патологическое опущение почки, что называется также «блуждающая почка».

В норме почка удерживается в ложе связочно-мышечными структурами и жировой капсулой. Степень подвижности не должна превышать 4-5 см. При нефроптозе кровеносные сосуды и мочеточник могут принять неестественное положение и форму, частично утратить проходимость.

Женщины страдают нефроптозом в несколько раз чаще, чем мужчины.

Основные причины нефроптоза- перестройка пропорций и взаимного расположения внутренних органов при беременности, резкая утрата массы тела (сокращение объема жировой клетчатки), мышечный гипотонус брюшной стенки.

Во многих случаях нефроптоз протекает бессимптомно и обнаруживается случайно.

Клинически значимая симптоматика является неспецифичной и слабо выраженной: тупая , тянущая боль в пояснице.

Наиболее информативные методы обследования — УЗИ органов брюшной полости, рентгенографические методы .

ЛЕЧЕНИЕ. Хирургическая реконструкция применяется редко- только при наличии четко прописанных серьезных показаний, и имеет ряд противопоказаний. Консервативное лечение в большинстве случаев является эффективным и успешным. Широко применяются эластичные бандажи,

н
а
д
е
в
а
е
м
ы
е

у
т
р
о
м
,

п
р
и

п
о
л
н