

- 
1. Изменение сознания. Малыш слишком сонлив, его не удается растормошить, не реагирует на вопросы – следует незамедлительно вызвать скорую помощь.
- 
2. Если жаропонижающие средства не снижают t ниже 39.5°C при условии, что дана необходимая доза препарата, у ребенка нет обезвоживания, он не укутан и находится в комнате с нормальной температурой воздуха (не более 23°C).
- 
3. Если дополнительно к высокой температуре тела у ребенка появляются различные высыпания на коже, необходимо записаться на прием к врачу (не экстренно). **НО!** Геморрагическая сыпь требует экстренного осмотра специалиста (при надавливании прозрачным стеклянным стаканом или прозрачной линейкой сыпь не бледнеет).
- 
4. Если малыш отказывается от воды и любой другой жидкости, у него сухой язык, бледная и холодная кожа, маленький объем выделяемой мочи или редкое мочеиспускание (реже 1 раза за 6 часов) требуется обязательный осмотр доктором в течение суток.
- 
5. Если у ребенка появилась одышка, учащенное дыхание (более 40 в минуту у детей старшего возраста и более 50 у грудных детей), затруднение вдоха или выдоха, боль в грудной клетке – вызвать скорую помощь или педиатра с пульсоксиметром и небулайзером).
- 
6. Если температура плохо снижается и сохраняется более 3 дней или температура вновь повысилась после нескольких дней ее нормальных значений, следует показать ребенка врачу (не экстренно).
- 
7. Если у маленького ребенка младше 3 месяцев температура тела выше 38°C необходимо в течение суток показать его специалисту.
- 
8. Если родители чувствуют, что с ребенком что-то не так, не нужно медлить. Необходимо звонить и показывать малыша доктору, ведь мама и папа, как никто другой, знают свою кроху.

Главное правило: в любой непонятной и нетипичной ситуации нужно обращаться к специалисту!